

Doxitec[®]

USO VETERINÁRIO

AÇÃO:

Antibiótico para cães e gatos.

APRESENTAÇÕES:

Cartuchos contendo 16 comprimidos palatáveis de 50 mg, 100 mg e 200 mg

FÓRMULA:

Cada comprimido contém:	50 mg	100 mg	200 mg
Doxiciclina hclato	56,50 mg	113,00 mg	225,00 mg
(Equivalente a 50 mg/100 mg/200 mg de doxiciclina)			
Excipientes q.s.p.	150,00 mg	300,00 mg	600,00 mg

Doxitec[®] é um antibiótico à base de doxiciclina, um antimicrobiano moderno e eficaz pertencente ao grupo das tetraciclina. É indicado para tratamento de uma variedade de infecções extracelulares e intracelulares, nos cães e gatos, em particular a Erliquiose Canina. **Doxitec[®]** atua sobre infecções respiratórias, urinárias e gastrointestinais causadas por: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Shigella flexnerie*, *Bordetella bronchiseptica*.

POSOLOGIA:

Para Cães:

Tratamento de infecções: administrar por via oral, na dose de 5mg/kg de peso, conforme abaixo:

- 1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso vivo.
- 1 comprimido de 100 mg para cada 20 kg de peso vivo.
- 1 comprimido de 200 mg para cada 40 kg de peso vivo.

Cães com peso acima de 50 Kg devem ser medicados seguindo a proporção acima.

Essa dose deve ser administrada a cada 12 horas durante 7 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário, podendo ser administrado junto com alimentos ou dissolvidos em líquidos.

Tratamento de Erliquiose Canina: administrar por via oral, na dose de 10mg/kg de peso.

Essa dose deve ser administrada a cada 12 horas durante 21 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.
Recomenda-se a continuidade do tratamento por 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

Não administrar o produto em fêmeas prenhes durante o terço final da gestação e nem em animais jovens em fase de desenvolvimento da dentição.

Para Gatos:

Doxitec[®] é administrado por via oral, à posologia de 10mg/kg de peso, ou seja:

- 1 comprimido de 50 mg para cada 5 kg de peso vivo.
- 1 comprimido de 100 mg para cada 10 kg de peso vivo.

Gatos com peso acima de 10 Kg devem ser medicados seguindo a proporção acima.
Essa dose deve ser administrada a cada 24 horas durante 7 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário, podendo ser administrado junto com alimentos ou dissolvidos em líquidos.

Recomenda-se a continuidade do tratamento por 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

EFEITOS ADVERSOS: Os principais efeitos colaterais relatados foram: náusea, vômito, anorexia e/ou diarreia. Estes efeitos podem ser aliviados administrando-se a droga junto com alimentos, sem que isso cause prejuízo para a absorção da mesma. Esses efeitos são normalmente leves e transitórios.

CONTRAINDICAÇÕES: Doxitec[®] é contraindicado para fêmeas gestantes durante o terço final de gestação, em cadelas ou gatas lactantes e animais jovens em fase de desenvolvimento da dentição. E em caso de hipersensibilidade conhecida às tetraciclina.

PRECAUÇÕES: Evitar administração simultânea de Doxitec[®] com antiácidos compostos contendo ferro e cálcio. Em evidência de eritema descontinuar o uso. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

PROIBIDO PARA USO HUMANO

Licenciado no Ministério da Agricultura nº 9089/2005 em 15/05/2005.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto -CRF/SP nº 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira