

# Prediderm Comprimidos 5 mg

Usos Veterinários

Anti-inflamatório esteroide à base de Prednisolona para cães

## Fórmula:

Cada comprimido de 200 mg contém:

Prednisolona ..... 5,00 mg  
Excipiente q.s.p. ... 200,00 mg

## Indicações:

### **Prediderm Comprimidos 5 mg**

é uma Prednisolona, potente anti-inflamatório esteroide. A Prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória (de 3 a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide (50% menos atividade mineralocorticoide do que o cortisol), o que resulta em menor retenção de sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como edema e hipertensão, comuns em terapias com esteroides.

### **Prediderm Comprimidos 5 mg**

é indicado para cães com patologias de caráter inflamatório ou que se beneficiam com a ação metabólica da Prednisolona.

## Modo de uso e dosagens:

O efeito terapêutico satisfatório de **Prediderm Comprimidos 5 mg**, assim como com outros corticosteroides, ocorre com a individualização da dosagem de acordo com a gravidade da doença, duração prevista para o tratamento e resposta individual do animal à terapia.

A administração de **Prediderm Comprimidos 5 mg** deve ser calculada com o objetivo de se obter a menor dosagem possível que resulte no máximo efeito terapêutico desejado, com mínimos efeitos colaterais.

As recomendações de dose que se seguem são baseadas na dosagem média diária total e contemplam as principais indicações de **Prediderm Comprimidos 5 mg**, devendo ser usadas apenas como referência. A terapia com **Prediderm Comprimidos 5 mg** deve ser iniciada com uma dose mais alta que é mantida até que se consiga a resposta

terapêutica desejada, o que normalmente ocorre num período de 2 a 7 dias na maioria das patologias. Tão logo uma resposta clínica satisfatória tenha sido obtida, a dose diária deve ser reduzida gradualmente para a finalização do tratamento, nos casos de doenças agudas. Nos casos de doenças crônicas, reduz-se gradativamente a dose inicial até uma mínima dose efetiva de manutenção.

Recomenda-se, nestes casos, a administração de

### **Prediderm Comprimidos 5 mg**

em dias alternados, pois este regime de administração permite a recuperação do eixo

hipotálamo-hipófise-adrenal, minimizando o aparecimento de efeitos colaterais.

A dose de manutenção deve ser ajustada periodicamente de acordo com as flutuações da atividade da doença e do estado geral do animal.

O intervalo entre as doses, bem como a duração do tratamento, variam de acordo com a patologia a ser tratada.

Indicações básicas	Dose inicial (ou de indução) de Prednisolona	Dose aproximada de Prediderm Comprimidos 5 mg
Reposição de glicocorticoides	<b>Cães</b> - 0,25 mg/kg de peso corporal/dia.	1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal/dia.
Tratamentos anti-inflamatórios e antialérgicos	<b>Cães</b> - 0,5 a 1,0 mg/kg de peso corporal cada 12 ou 24 horas.	<b>Cães</b> - 1 comprimido para cada 5 a 10 kg de peso corporal cada 12 a 24 horas.

### **Precauções:**

Como a terapia com corticosteroides pode ocasionar uma leve retenção de sódio e água, o primeiro sinal de uma superdosagem de corticoide

(isto é, aumento de peso corporal pela retenção de fluidos), não é um índice seguro de interpretação de superdosagem. Em

consequência disto, a dose recomendada não deve ser excedida e os animais submetidos à terapia com Prednisolona devem estar sob constante supervisão veterinária.

A suspensão da terapia com corticosteroides, dependendo da dose utilizada e duração do tratamento, pode causar uma supressão na produção

de esteroides endógenos, conseqüentemente, animais que tenham terminado a terapia recentemente, podem necessitar da administração de corticosteroides de ação rápida quando submetidos a situações de estresse como cirurgias, traumas ou infecções severas.

A Prednisolona pode mascarar sinais de infecção. Caso ocorra alguma infecção intercorrente ao tratamento com **Prediderm Comprimidos 5 mg**, esta deverá ser controlada com o uso de antibióticos apropriados ou a administração de **Prediderm Comprimidos 5 mg** deverá ser descontinuada.

### Contraindicações e limitações de uso:

Os corticosteroides devem ser usados o mais criteriosamente possível em animais com doenças infecciosas, úlceras de córnea, hemorragias e/ou perfurações gastrintestinais, pancreatites, enteropatias, doenças renais, cardiopatias, diabetes mellitus ou animais em fase de crescimento. Não administrar a fêmeas gestantes e em lactação. Não administrar a animais com infecções fúngicas. A eliminação dos

corticosteroides pode ser prejudicada na presença de hepatopatias.

### Interações medicamentosas:

Drogas que usam o sistema glicuronil-transferase podem competitivamente inibir a excreção de corticosteroides. Indutores enzimáticos como a fenitoína, fenobarbital, organoclorados e fenilbutazona podem acelerar a eliminação dos corticosteroides.

O uso concomitante de corticosteroides com diuréticos depletors de potássio (furosemida) ou com a Anfotericina B pode intensificar a hipopotassemia. O uso de corticosteroides com glicosídeos cardíacos pode aumentar a possibilidade de arritmias ou intoxicação digitalica associada à hipopotassemia. Os glicocorticoides podem reduzir os níveis sanguíneos de salicilatos.

O uso de corticosteroides em animais diabéticos pode acarretar a necessidade de aumento da dose de insulina. Não se recomenda a aplicação de vacinas com vírus atenuado a animais submetidos a tratamento com corticosteroides em

doses imunossupressivas. A administração de anti-inflamatórios não esteroides concomitantemente com corticosteroides pode aumentar a incidência de úlceras gástricas.

### Reações adversas:

O risco de efeitos adversos provenientes de terapia por corticosteroides está diretamente relacionado a sua potência, dosagem, duração de ação, intervalo entre doses e duração de tratamento. A duração da ação é afetada pela capacidade do corpo em metabolizar e eliminar o corticosteroide, a dose usada e a velocidade de absorção, sendo que estes fatores sofrem modificações de um animal para outro. Doses imunossupressivas causam efeitos colaterais mais frequentes e mais graves. A administração de corticosteroides por mais de seis meses pode estar associada com infecções do trato urinário, especialmente em cadelas.

O uso de corticosteroides pode causar um aumento do volume intravascular, agravando quadros de insuficiência cardíaca

congestiva, pois facilita os desvios extracelulares de água e a retenção de sódio. A corticoideterapia frequentemente causa polidipsia, polifagia e poliúria em cães.

Síndrome de Cushing em cães tem sido associada com terapias prolongadas com corticosteroides.

Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.**

### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da agricultura sob nº 9.577 em 18/08/2010

KIT 50003073/15

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofinaudeanimal.com](http://www.ourofinaudeanimal.com)  
Indústria brasileira

☎ 16 3518 2025



50003073/0718 CFDCO

 **ourofino**  
saúde animal